


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España, para el día 25 de agosto de 2026


Se prevé que durante las primeras horas del día 25 de agosto se puedan registrar concentraciones de polvo en el rango $5\text{--}50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas de las islas Baleares, que tenderán a reducirse a lo largo del día. Además, se prevé que se pueda producir depósito seco y depósito húmedo de polvo en zonas del archipiélago balear y del sector NE de la península, durante la primera mitad del día.

25 de agosto de 2026




Resultado de la comparación de varios modelos de predicción de concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 25 de agosto de 2026 a las 00h (izquierda) y 12h UTC (derecha). © Barcelona Dust Regional Center.

El resultado de la comparación de varios modelos proporcionado por el Barcelona Dust Regional Center prevé concentraciones de polvo en el rango $5\text{--}50\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas de las islas Baleares durante las primeras horas del día 25 de agosto, que tenderán a reducirse a lo largo del día.




Resultado de la comparación de varios modelos de predicción de concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 25 de agosto de 2026 a las 00h (izquierda) y 12h UTC (derecha). © Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

El resultado de la comparación de varios modelos proporcionado por el Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) prevé concentraciones de polvo en el rango $10\text{--}40\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas de las islas Baleares durante las primeras horas del día que tenderán a reducirse con el transcurso de las horas.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo Skiron para el día 25 de agosto de 2026 a las 00 (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo SKIRON prevé concentraciones de polvo en el rango $10\text{--}25\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas del archipiélago balear durante las primeras horas del día 25 de agosto.




Campo de presión a nivel del mar (mb) y de precipitación (mm) (izquierda) y de temperaturas (°C) y de altura de geopotencial (m) a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo Skiron para el día 25 de agosto de 2026 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.




Carga total de polvo (mgr/m^2) predicha por el modelo Skiron para el día 25 de agosto de 2026 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Las altas presiones en superficie y altura que permanecerán previsiblemente sobre zonas del N de África y del sector central de la cuenca mediterránea favorecerán el desarrollo de flujos de viento de componente SO sobre el tercio oriental de la península y las islas Baleares.

Durante la primera mitad del día se podrá producir depósito seco y depósito húmedo de polvo en zonas del archipiélago balear y del sector NE de la península.



Dépósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 25 de agosto de 2026 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Dépósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 25 de agosto de 2026 a las 00 UTC (izquierda) y a las 06 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Fecha de elaboración de la predicción: 24 de agosto de 2026

Predicción elaborada por Pedro Salvador (CIEMAT)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.