


PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT UNA ANAFILAXI EN CENTRES EDUCATIS


1r PAS: AVALUAR I TRACTAR

Afecta 1 òrgan tot sol.		VIGILAU	➤ Borradura o favasses, envermelliment, picor a la boca o als llavis. Administreu la medicació pautada per l'equip sanitari
			➤ Inflor de: llavis, parpelles, mans o d'una altra part del cos. Administreu la medicació pautada per l'equip sanitari
			➤ Dolor abdominal, nàusees, vòmits o diarrees. Administreu la medicació pautada per l'equip sanitari
			➤ Picor d'ulls o de nas, esternuts freqüents, mucositat abundant, ulls vermells o llagimeig. Administreu la medicació pautada per l'equip sanitari
Afecta 2 o més de 2 òrgans.		EMERGÈNCIA	➤ Opressió a la gargamella, veu ronca o afònica, tos repetitiva. ADMINISTRAU ADRENALINA AUTOINJECTABLE: 0,15/150-030/300
			➤ Respiració dificultosa, veu entretallada, tos seca repetitiva, ofec, xiulets, pell o llavis blaus. ADMINISTRAU ADRENALINA AUTOINJECTABLE: 0,15/150-030/300
			➤ Pal·lidesa, pols dèbil, pèrdua de coneixement, mareig, sensació de mort imminent. ADMINISTRAU ADRENALINA AUTOINJECTABLE: 0,15/150-030/300


2n PAS: SI SOSPITAU D'ANAFILÀXIA, AVISAU EL 061 I SEGUIU INSTRUCCIONS

1. NO DEIXEU MAI EL NIN/L'ADOLESCENT TOT SOL.
2. Telefonau a Urgències (Tel.: 061) i comunicau que es tracta d'una anafilaxi.
3. Cridau els pares o els tutors legals.
4. Encara que no pugueu contactar amb els pares o amb el representant legal, no dubteu d'administrar-li la medicació (deure de socors) seguint les instruccions del 061.

1. Agafau la ploma autoinjectable d'adrenalina amb la mà dominant (la que empraueu per escriure), amb el dit gros al costat del tap de seguretat.



2. Amb l'altra mà llevau el tap de seguretat (groc o blau segons l'adrenalina).



3. Col·locau l'extrem negre o taronja de l'injector a la part externa de la cuixa i subjectau-lo en angle recte.



4. Pressionau L'extrem negre o taronja de l'injector enèrgicament fins que sentiu el clic que confirma que ha començat la injecció. Manteniu-lo pressionat 10 segons.



5. Feis un massatge a la zona d'injecció durant 10 segons.



6. Telefonau al 061, digau "anafilaxi" i sol·liciteu atenció mèdica immediata.

