



PAROTIDITIS

Definición de caso

Criterio clínico

- Fiebre y, al menos, una de estas manifestaciones:
- Aparición súbita de tumefacción, dolorosa al tacto, de las parótidas u otras glándulas salivares
 - Orquitis

Criterio de laboratorio

- Al menos, uno de los siguientes:
- Aislamiento del virus de la parotiditis en muestra clínica (saliva, orina o LCR)
 - Detección de ácido nucleico del virus de la parotiditis por PCR en muestra clínica (saliva, orina o LCR)
 - Respuesta de anticuerpos específicos del virus de la parotiditis en el suero (detección de IgM o seroconversión de IgG)

Criterio epidemiológico

Contacto con un caso de parotiditis confirmado por laboratorio entre 12 y 25 días antes del inicio de los síntomas

Clasificación de los casos

- **Caso sospechoso:** persona que cumple **criterio clínico**.
- **Caso probable:** persona que cumple **criterio clínico** y **criterio epidemiológico**
- **Caso confirmado:** persona que cumple **criterio clínico** y **criterio de laboratorio**

Definición de brote

Aparición de dos o más casos confirmados o probables relacionados. A efectos de investigación y notificación, sólo se considerarán los brotes que tengan relevancia epidemiológica por el **grupo de población** en el que aparecen los casos, por la **gravedad** de la enfermedad o por el **lugar** donde ocurren (centros penitenciarios, establecimientos militares, hospitales, centros escolares, centros de formación, universidades).