

12) Traumatisme bucodental

Què són

Són lesions a les parts blanques de la boca o a les dents produïdes per un traumatisme.

Actuació

- Netejau suaument amb aigua la boca de la víctima.
- Aplicau-hi frescor local si observau que hi ha inflamació.
- Si hi ha un traumatisme dental en la dentició permanent, és important localitzar el fragment de la dent o la dent sencera, ja que hi ha la possibilitat de reimplantar-la; a més, hi ha el risc d'aspirar-la, d'empassar-se-la o que s'incrusti a les parts blanques:
 - Agafau la dent per la corona i evitau tocar-ne l'arrel.
 - Si és necessari, netejau-la amb sèrum fisiològic amb poca pressió.
 - Conservau la dent submergida en llet, sèrum fisiològic o fins i tot la saliva mateixa.
- Si la dent s'ha desplaçat però no s'ha després, no la manipuleu.
- Si presenta signes o símptomes alarmants com traumatisme dental (total o parcial), hemorràgia que no s'atura o talls, avisau al 061 i seguïu les indicacions que us hi donin.
- Avisau la família de la víctima.

És important acudir amb urgència a odontologia si la dent es pot reimplantar; l'èxit depèn del temps transcorregut des del traumatisme (la primera hora és la més important).

