



Perforadores de los pinos. (*Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*)

Text Luis Núñez. Cap del Server de Sanitat Forestal.

Apeo de los árboles muy enfermos y debilitados con producción de serrín (por *Tomicus destruens*); desde principios de octubre y especialmente en noviembre, diciembre, enero y febrero. (Ver gráfico adjunto de incidencia de las dos especies, que se ha de ajustar a las condiciones de la zona y del año climatológico).

Colocación de árboles-cebo (por *Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*); todo el año cada 21 días, paulatinamente en tiempo y espacio que se ha de ajustar a las condiciones de la zona y del año climatológico).

Destrucción de los cebos (por *Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*); cada 21 días, según condiciones climatológicas.

Pulverización de los árboles sanos (por *Tomicus destruens*); abril, mayo o junio dependiendo de la salida de los imagos, según prescripción facultativa, y en dos fases por los efectos de los productos a utilizar, pues por motivos de seguridad de los usuarios de las instalaciones no se debe utilizar otros más persistentes y peligrosos.

Orthotomicus erosus.

Se puede comentar lo mismo que para el *Tomicus destruens*.

La época mas "peligrosa" es la primavera y el verano, en términos generales.



ACTUACIÓN

EPOCA

Corte, descortezado y eliminación de los árboles afectados y no resistentes.
Triturar todos los residuos y dejarlos en un montón para su descomposición o para su quema.

primavera - verano

Corte y eliminación de todos los restos de ramas de poda o otros tratamientos por medio de trituración o quema.

primavera - verano

Descortezado de los árboles atacados.

primavera - verano

Búsqueda de nuevos pies en fase de ataque inicial y eliminación, en su caso.

primavera - verano

Colocación (Instalación) de árboles cebo con un control muy estricto.

primavera - verano

Corte, descortezado y eliminación de los arboles
Nueva instalación de árboles cebo.

Cada 21 días se han de revisar y cambiar.

Pulverización del árbol con productos Fitosanitarios con efecto repelente como barrera protectora del árbol (tipo piretroide).
(Aplicación terrestre con cañón nebulizador).

primavera - verano

Nota: Es imprescindible eliminar, sacar, quemar, etc. los troncos rápidamente, debido a que existe el riesgo de salida de los insectos adultos reproductores de los troncos, si se dejan en el suelo.

NOTA: Los productos son orientativos y SIEMPRE se ha de comprobar antes de su utilización, que esté autorizada la materia activa a aplicar en el vegetal correspondiente.