

COMARCAS

La marina de Lluçmajor es la zona más afectada por la procesionaria

La conselleria de Medio Ambiente inició el lunes la venta de 120.000 cartuchos para atacar la plaga

MARIBEL CAÑELLAS. Palma.

Los niveles de procesionaria han aumentado considerablemente en el último año. En 2006 la conselleria de Medio Ambiente registró un repunte importante de esta plaga respecto a los ejercicios anteriores, todo ello a pesar de la intensa campaña de exterminio que se lleva a cabo desde la cartera que dirige Jaime Font, siendo la zona más afectada por esta oruga la Marina de Lluçmajor, aunque también y en menor proporción, la zona de es Trenc, algunos puntos del Llevant y de la zona Norte.

Según explicaron desde la citada Conselleria, la presencia severa de procesionaria se registró en 20.867 hectáreas de pinar, el equivalente al 25% de la superficie forestal, mientras que en finales de 2005 estas proporciones habían caído hasta el 2%. Desde Medio Ambiente achacan este incremento a las condiciones meteorológicas, principalmente un verano no excesivamente cálido, que ha contribuido a la explosión de crisálidas de este insecto.

En este sentido el Govern prepara una nueva ofensiva contra la procesionaria, cuyo presupuesto anual oscila entre los 600.000 y 700.000 euros. En el marco del plan para el control integral de esta oruga, y toda vez concluida la campaña de fumigación —realizada en un área de zona boscosa de entre 20.000 y 30.000 hectáreas— la Conselleria abrió el lunes el plazo para la compra de cartuchos, "una medida suplementaria en la lucha contra el daño lepidóptero" que pretende "minimizar sus efectos nocivos entre la población" informan desde el Govern.


En total se dispensarán, a 0,10 céntimos, 120.000 cartuchos para la eliminación de los bolsones. Los interesados tendrán hasta el 28 de febrero para adquirirlos, previa presentación de una copia de la escritura de la finca donde se pretende actuar.

Procesionaria del pino


GRÁFICO: DIARIO DE MALLORCA

ZONAS AFECTADAS SEGÚN EL GRADO DE ATAQUE


- Nivel 0
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 4
- Nivel 5



DISTRIBUCIÓN POR NIVELES



COMPARACIÓN 2003-2006



FUENTE: GOVERN BALEAR

EVOLUCIÓN

Del 2% en 2005 al 28% en 2006

La procesionaria es la plaga más dañina del pino mediterráneo. En 2003 los niveles de afectación en su grado máximo llegaban hasta el 60%, abarcando una superficie de casi 45.000 hectáreas. Entre las zonas más infectadas se hallaba la zona de Ponent, algunos puntos de Lluçmajor, así como en la comarca del Pla, Llevant y el Norte, donde la procesionaria se hallaba muy diseminada. Ya en 2004 los índices bajaron hasta el 30%, el equivalente a 22.278 hectáreas. En ese ejercicio el grado máximo de afectación descendió notablemente en la zona de Ponent, Lluçmajor y en la comarca del Llevant, situación que mejoraría aún más en el siguiente año, donde la conselleria de Medio Ambiente logró casi erradicar el nivel más elevado de la procesionaria en la isla, que llegaría a ser sólo de un 2%. El mapa prácticamente se estabilizó, quedando únicamente un reducto de 1.537 hectáreas en la zona Norte. Desgraciadamente, en 2006 se produjo un importante repunte a consecuencia de las condiciones climatológicas propicias para este insecto, afectando de manera notable a la Marina de Lluçmajor, siendo ésta la zona de mayor rebrote. Otros puntos del Pla así como del Llevant y la zona Norte (Artà, Santa Margalida y Muro, entre otros) también sufrieron las consecuencias. En total, el nivel más acuciante de la procesionaria se disparó hasta el 28%, afectando a casi 21.000 hectáreas de masa boscosa de Mallorca.

En este sentido, Marratxí ha sido una de las primeras localidades en adquirir munición. Según explicaron desde el Consistorio, la regiduría de Medio Ambiente se ha hecho con 25.000 cartuchos que servirán para atajar la proliferación de esta larva.

Paralelamente, informaron fuentes de la Conselleria, las brigadas forestales del Ibanat realizarán este tipo de exterminio en las fincas públicas, en las que posteriormente se llevarán a cabo controles periódicos para analizar su efectividad.

El control de la plaga se complementa, tal y como viene realizando la Conselleria desde el año 2003, con la colocación de nidos y refugios para aves insectívoras y murciélagos, depredadores de estas orugas, durante los meses de enero y febrero, así como también con la instalación de trampas con feromonas que atraen la procesionaria en los meses de junio y julio.