Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Instrucción de la DG Salud Pública para el año 2025

Vacuna disponible:
GARDASIL 9 suspensión inyectable en jeringa precargada

VACUNACIÓN SISTEMÁTICA

Niños y niñas de 12 años

1 DOSIS

CAPTACIÓN

Hombres y mujeres
de entre 13 y 18 años
no vacunados con ninguna dosis

1 DOSIS

PERSONAS EN DETERMINADAS SITUACIONES DE RIESGO

Hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres y
personas en situaciones de prostitución:

- Hasta los 25 años: **1 DOSIS**
- De los 26 a los 45 años: **2 DOSIS**

(separadas entre sí al menos 6 meses)

PERSONAS EN CONDICIONES DE RIESGO HASTA LOS 45 AÑOS (incluidos)

Personas que pertenecen a los siguientes grupos: síndrome WHIM (IDP), infección VIH o trasplante de órgano sólido
o de progenitores hematopoyéticos:

3 DOSIS
(0,1-2 y 6 MESES)

PERSONAS EN CONDICIONES DE RIESGO

Mujeres que han recibido tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado de cérvix (CIN2+):

3 DOSIS
(0,1-2 y 6 MESES)
Preferentemente, antes
del tratamiento de la lesión.
Si no es posible, lo más pronto posible
una vez finalizado el tratamiento.

Siempre que coexista una situación de inmunosupresión, la pauta será de 3 DOSIS.

Las personas que anteriormente hayan recibido una o dos dosis de una vacuna contra el VPH y se encuentran en una situación/tienen una condición de riesgo: se debe completar la pauta en función del grupo al que pertenecen.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Promocionar el **Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix** entre las mujeres de 25 a 65 años.

Fomentar **la educación en sexualidad saludable en función de la población diana a la que va dirigida** (adolescentes y personas en situaciones de riesgo).